

สารบัญ

	หน้า		หน้า
1. บุคลากรทางการแพทย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ หลังเอดส์ระบาดจริงหรือ?	7	9. แพทย์โรงพยาบาลพร่องกว่าการรักษาวัณโรค ได้ผลสำเร็จเพียง 30 %	29
2. โรงพยาบาลไม่รับบริจาคศพเอดส์	10	10. ประเทศไทยมีเชื้อวัณโรคคือต่อยา rifampicin มากที่สุดในโลก	33
3. เมื่อแพทย์เริ่มยาต้านไวรัสเอดส์ ด้วยการเจาะเลือด CD4	11	11. การรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ในผู้ติดเชื้อเอดส์	35
4. หมอบรรลุ คิริพานิช ประธานผู้ตรวจสอบการทุจริต ในกระทรวงสาธารณสุข	15	12. ฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของยากลุ่ม Protease inhibitor ที่แพทย์ควรเฝ้าดู	39
5. งานประชุมเอดส์ที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนกันยายน 2541	17	13. พบว่ามีการแพร่เชื้อไวรัสเอดส์ที่ต่อยาหลายตัว	41
6. คณบดีเกี่ยวกับหลักสูตร ของ Dali Medical College	21	14. การสังยารักษาการติดเชื้อ CMV	45
7. สิทธิของผู้ป่วย	23	15. บุคลากรทางการแพทย์ห้ามผู้ป่วย CMV retinitis ไปฉีดยาห้องตา	47
8. การศึกษาวิจัย แต่มีการส่งยาไม่ต่อเนื่อง	27	16. การเอาผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสก่อน มาวิจัยใน	

	หน้า		หน้า
ARVPROT 1	51	24. 13 ปีกับการรณรงค์ต่อต้านเอดส์	73
17. ผลของการหยุด HAART ชั่วคราว	53	25. สรุปผลการประชุมเอดส์ที่ลีวิตเซอร์แลนด์ และความคิดเห็นของผู้เขียน	83
18. การใช้ยา Efavirenz (sustiva = DMP266)	55	26. คนไข้เอชไอวีได้นัดทำ CT ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ต้องรอ 2 อาทิตย์ แต่ได้รับคำแนะนำจากข้าราชการ ให้ไปตีบริการพิเศษของโรงพยาบาลเดียวกัน และได้รับการตรวจ CT วันรุ่งขึ้นนั้น ทั้งๆ ที่เครื่อง CT ก็เครื่องเดียวกัน	91
19. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอดส์ของคนจีนที่ด้าลี่ ในสายตาของผู้เขียน	57	27. มีการแนะนำให้ใช้ azithromycin ป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์	93
20. เป็นไปได้หรือไม่ว่าลูก 7 เดือน ติดเอดส์แต่พ่อแม่ปลอดเอดส์	59	28. การจัดนิทรรศการภาพเพื่อหาเงินซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ ให้เด็กมูลนิธิเกื้ออรุณ	95
21. ความคิดเห็นของผู้ให้คำแนะนำปรึกษา แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ตั้งครรภ์	63	29. มูลนิธิเกื้ออรุณ	100
22. เมื่อบุคลากรทางการแพทย์อายุ ไม่กล้าพาแม่ที่ติดเชื้อเอดส์มาตรวจ	67		
23. บุคลากรทางการแพทย์ มีส่วนทำให้วัณโรคแพร่มากขึ้น	69		